

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ TALC ΣΕ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ ΓΙΑ ΠΛΕΥΡΟΔΕΣΗ

Το σκεύασμα διατίθεται σε αποστειρωμένη συσκευασία σε γυάλινο φιαλίδιο με περιεκτικότητα 4gr talc ανά flacon.

24 ώρες πριν την χρήση πρέπει να έχει προηγηθεί παροχέτευση της θωρακικής κοιλότητας.

### Διάλυση

Το talc διαλύεται σε 50ml φυσιολογικού ορού και μετά από καλή ανάδευση αφαιρείται το πώμα του φιαλιδίου και γίνεται αναρρόφηση με σύριγγα των 60ml.

### Έγχυση

Το περιεχόμενο της σύριγγας εγχύεται διαμέσου του σωλήνα παροχέτευσης με σταθερό ρυθμό. Κατά το τέλος της έγχυσης εμβολίζουμε 5-10ml φυσιολογικού ορού και 10ml αέρα για τον επιμελή καθαρισμό του σωλήνα παροχέτευσης μετά την διαδικασία. Στην συνέχεια φράζουμε τον σωλήνα παροχέτευσης για 4-6 ώρες και ο ασθενής ανά τακτά χρονικά διαστήματα 30 λεπτά αλλάζει θέσεις σώματος για την σωστή κατανομή του διαλύματος.

Ύστερα από διάστημα 6 ωρών ανοίγουμε τον παροχέτευτικό σωλήνα και παρατηρούμε την συλλογή υγρού για τις επόμενες 14 - 18 ώρες.

Εάν η συλλογή υγρού είναι μικρότερη των 150 ml η παροχέτευση αφαιρείται και γίνεται σύγκλιση του τραύματος.

### Φαρμακευτική προετοιμασία

Ήπια καταστολή με χορήγηση πεθιδίνης 50mg ενδομυϊκός μισή ώρα πριν την έγχυση και 40mgr μεθυλπρεζονόλης ενδοφλεβίως κατά την διάρκεια.

Ο ασθενής καλύπτεται με χορήγηση αντιβιοτικού ευρέως φάσματος

### Δοσολογία Steritalc®

Βάρος σώματος	Mgr ανά κιλό Β.Σ	Χορηγηθείσα δόση
40Kg	75mgr / Kg	3gr
50Kg	75mgr / Kg	3.75gr
60Kg	75mgr / Kg	4.5gr
70Kg	75mgr / Kg	5.25gr